MANCHON MOBIDERM AUTOFIT

Manchon avec mitaine, mobilisateur et compressif, ajustable, pour le traitement du lymphœdème du membre supérieur

Tailles 1 à 6 | **Normal / Long** | **Jour et nuit** | **Classe I**



IDENTIFICATION

Réf. FRAMED	Voir tableau
Fabricant	Thuasne (France)
Matière	Textile (PA, PES, coton, PU, élasthanne) ; plots de mousse
Statut	Dispositif médical classe I
N° LiMA	17.06.01.00.1

CARACTÉRISTIQUES

- Plots de mousse Mobiderm : zones de pression différentielle favorisant le drainage lymphatique
- Attaches auto-agrippantes réglables ; port de jour ou de nuit

INDICATIONS

- Œdème aigu ou chronique (lymphœdème), phase intensive et/ou de maintien

TAILLES ET MESURES

Prise de mesure Tours en cm ; longueur poignet–aisselle : Normal 40 – 45, Long 45 – 50 cm.

Taille	Bras	Avant-bras	Poignet	Main	Normal · D	Normal · G	Long · D	Long · G
1	25 – 32	22 – 28	15 – 19	17 – 21	37330420100261	37330620100262	37330420100271	37330420100272
2	29 – 36	24 – 30	16 – 20	17 – 21	37330420200261	37330620200262	37330620200271	37330420200272
3	33 – 40	26 – 32	17 – 21	18 – 22	37330420300261	37330420300262	37330620300271	37330420300272
4	37 – 44	28 – 34	17 – 21	18 – 22	37330420400261	37330420400262	37330620400271	37330420400272
5	41 – 48	30 – 36	18 – 22	19 – 23	37330420500261	37330420500262	37330420500271	37330420500272
6	45 – 52	31 – 37	19 – 23	20 – 24	37330420600261	37330420600262	37330420600271	37330420600272

CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS

- Dermatose majeure, allergie, neuropathie sévère, thrombose septique, phlegmatia coerulea dolens
- pathologie du plexus brachial, vascularite des extrémités
- Pas sur plaie ouverte ; patient unique

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN

Insérer la main, glisser jusque sous l'aisselle, refermer depuis la main.

Entretien : lavage quotidien, attaches fermées, à froid (main ou cycle laine en filet) ; séchage à l'air.

Notice d'utilisation

Prix unitaire, CHF HT **Sur demande**